

ADVANTAGE® Chat - Solution cutanée pour dépôt

Indications :

Chez les chats, affections à parasites sensibles à l'imidaclopride : traitement et prévention des infestations par les puces. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 3 à 4 semaines pour les chats. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la D.A.P.P.

Administration et posologie :

Voie locale externe.

Administrer directement sur la peau en haut du cou de l'animal.

Chats de moins de 4 kg : une pipette d'ADVANTAGE® 40 de 0,4 ml.

Chats de plus de 4 kg : une pipette d'ADVANTAGE® 80 de 0,8 ml.

Les puces sont tuées dans les 24 heures après application du traitement. Un seul traitement prévient les réinfestations par les puces pendant 3 à 4 semaines. Le renouvellement du traitement peut s'avérer nécessaire en fonction de la pression parasitaire.

Le traitement reste efficace si l'animal est mouillé par exemple après un bain ou une averse. Cependant le renouvellement du traitement peut s'avérer nécessaire en fonction de la présence ou non de puces dans l'environnement. Dans ce cas, un intervalle d'au minimum une semaine doit être respecté entre deux applications.

Lors d'infestation massive de l'environnement par les puces, il peut être recommandé d'utiliser en complément un traitement approprié de l'environnement contre les puces adultes et leurs stades de développement.

Mode d'administration :

- Sortir une pipette de l'emballage.
- Tenir la pipette en position verticale, tourner et tirer le capuchon.
- Utiliser le bouchon à l'envers pour visser et perforer l'orifice de la pipette.
- Maintenir le chat en position debout, écarter les poils de la base du cou.
- Placer l'extrémité de la pipette sur la peau et presser fermement plusieurs fois pour en vider le contenu directement sur la peau.

Contre-indications :

Ne pas traiter les chatons non sevrés de moins de 8 semaines.

Effets indésirables :

Le produit a un goût amer et peut provoquer occasionnellement une salivation si le chat se lèche au site d'application, immédiatement après le traitement. Il ne s'agit pas d'un signe d'intoxication ; cet effet disparaît en quelques minutes sans aucun traitement.

Précautions :

• **Précautions particulières d'emploi :**

- Appliquer le produit sur une peau saine.
- Éviter le contact de la solution avec les yeux ou la bouche de l'animal.
- Veiller à ce que les animaux récemment traités ne puissent se lécher entre eux.

• **Précautions en cas de gravidité ou de lactation :**

- Aucun effet embryotoxique, tératogène ou sur la reproduction n'a été observé lors des études menées avec l'imidaclopride chez le rat et le lapin.
- Les études menées chez les chattes en gestation et en lactation, en contact avec leur portée, sont limitées. Ces essais n'ont montré aucun effet indésirable chez ces animaux.

• **Interactions médicamenteuses :**

Aucune interaction n'a été observée entre ce médicament, administré à 2 fois la dose thérapeutique, et les

médicaments antiparasitaires vétérinaires classiquement utilisés. La compatibilité de ce médicament a également été démontrée avec un large éventail de traitements de routine dans les conditions pratiques, y compris la vaccination.

• **Surdosage :**

- L'application hebdomadaire à 5 fois la dose thérapeutique pendant 8 semaines n'a provoqué aucun signe clinique indésirable.
- Une intoxication après ingestion accidentelle chez l'animal est improbable. En cas d'ingestion accidentelle, un traitement symptomatique sera instauré. Il n'y a pas d'antidote spécifique. L'administration de charbon actif pourra être bénéfique.

• **Précautions particulières pour l'utilisateur :**

- Bien se laver les mains après utilisation.
- En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec les yeux ou la bouche. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment les yeux à l'eau. Si une irritation de la peau ou des yeux persiste, ou en cas d'ingestion accidentelle du produit, consulter un médecin.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
- Les personnes présentant une sensibilité cutanée connue peuvent être particulièrement sensibles à ce produit.

Catégorie :

Médicament à usage vétérinaire.

Composition :

Imidaclopride : 100 mg – Butyl-hydroxytoluène : 1 mg – Excipient q.s.p. 1 mL.

Présentations :

ADVANTAGE® 40 pour chat : Plaquette thermoformée de 4 pipettes polypropylène de 0,4 mL. A.M.M. 676 277.4 du 06/11/97

ADVANTAGE® 80 pour chat : Plaquette thermoformée de 4 pipettes polypropylène de 0,8 mL. A.M.M. 676 278.0 du 06/11/97.

N° Vert Infos techniques : 0 800 222 937. Laboratoire : BAYER PHARMA Division Santé animale - 13, rue Jean Jaurès - 92807 PUTEAUX CEDEX - Tél. : 01.49.06.56.00 - Fax : 01.49.06.58.48